

TAC ENCEFALO (CMDIC)
TAC TORACE (CMDIC)
TAC ADDOME COMPLETO (CMDIC)

L'esame TC è stato eseguito con tecnica spirale multistrato prima e dopo iniezione in bolo di mdc per via endovenosa.

CRANIO:

Non si osservano segni di lesioni espansive endocraniche, nè significative alterazioni della densità dell'encefalo in sede sovra e sotto tentoriale.

Non aree di impregnazione a carattere patologico.

Regolare l'ampiezza del sistema ventricolare e degli spazi liquorali periencefalici in rapporto all'età.

TORACE:

Rispetto al precedente controllo del 21.12.2010 eseguito in questa sede si segnala:

- Lieve aumento delle dimensioni delle localizzazioni secondarie parenchimali polmonari bilaterali con diametro massimo, a livello del lobo medio, di 1,6 cm circa (diametro precedente 1,3 cm).
- Evidente aumento dell'impegno secondario apprezzabile a livello pleurico con aumento del numero e delle dimensioni di impianti pleurici a carattere nodulare, il maggiore dei quali, in sede medio toracica laterale sn, con diametro 3,5 cm circa. Concomita la presenza di una ampia falda di versamento pleurico sin.
- Invariati i restanti reperti.

ADDOME:

Rispetto al precedente controllo si segnala:

- Aumento delle dimensioni della neoformazione solida ad impregnazione disomogenea localizzata nella sede del pregresso intervento di nefrectomia sn, con diametro attuale massimo di 6,7 cm circa e del nodulo satellite con caratteristiche analoghe, a verosimile localizzazione surrenalica sinistra, del diametro di 3,8 cm circa.
- Presenza di localizzazioni secondarie epatiche multiple, a carico di entrambi i lobi, con aspetto ipervascolare, la maggiore delle quali, a livello della porzione caudale del VI segmento, con diametro di 3,5 cm circa.
- Invariate le piccole immagini cistiche epatiche già precedentemente