

Esame refertato a confronto con il precedente esame del 27.04.2011 eseguito presso altra sede e portato in visione.

TC TORACE CON MDC

All'odierno controllo si segnala ulteriore aumento del numero e delle dimensioni delle note localizzazioni secondarie pleuro-parenchimali di malattia; in particolare attualmente le tre lesioni contigue di maggiori dimensioni, apprezzabili nel segmento apicale del lobo superiore di destra, in regione dorsale, mostrano dimensioni assiali massime di 37x25mm circa vs 30x14mm circa mentre la placca pleurica apprezzabile in sede basale posteriore sinistra mostra dimensioni massime di 42x20mm circa vs 35x10mm circa.

Sottile falda di versamento pleurico in sede basale sinistra, lievemente aumentata.

Invariati i restanti reperti.

TC ADDOME CON MDC

All'odierno controllo si segnala netto aumento del numero e delle dimensioni delle note multiple localizzazioni epatiche ipervascolari secondarie di malattia (dimensioni massime attuali di 6cm circa vs 2.8cm circa). Non evidente dilatazione delle vie biliari.

Pervie le vv sovraepatiche e la vena porta.

Aumentato appare il tessuto solido neoformato segnalato nella sede della loggia renale sinistra, compatibile con residuo/recidiva di malattia (dimensioni assiali massime attuali di 11x7.6cm circa vs 8.5x5.8cm circa), infiltrante il diaframma limitrofo, la capsula splenica e la coda pancreatica con perdita dei piani di clivaggio adiposo esistenti con alcune anse tenuali digiuno-ileali e con la vena splenica. Non livello idroaerei di carattere patologico.

Aumentato appare l'impianto solido di malattia apprezzabile nello scavo pelvico, in adiacenza del mesosigma (dimensioni attuali di 15mm circa vs 4mm).

Non idronefrosi a destra. Cavità peritoneale libera da versamento.

Invariati i restanti reperti.

CONCLUSIONI

Segni TC di progressione di malattia.